Programma Nazionale Esiti (PNE)

Edizione 2014,

Dati 2013 - Toscana

Programma Nazionale Esiti (PNE) Edizione 2014, Dati 2013 - Toscana

In Toscana nel 2013 sono stati ricoverati pazienti più complessi che nelle altre regioni: vedi valore indice di case mix (ICM)

Per curare questi pazienti sono stati necessari meno giorni di ricovero che nelle altre regioni: vedi valore indice di case performance (ICP)

Attività per acuti in regime ordinario, confronto ICM – ICP, 2013



Fonte: Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero, Dati SDO 2013, Ministero della Salute

L’efficacia delle cure ospedaliere in Toscana nel 2013 viene convalidata anche dai risultati degli indicatori di esito PNE dove si conferma essere tra le regioni con il maggior numero di indicatori al di sopra della media nazionale per il secondo anno consecutivo

Percentuale di indicatori rispetto alla media nazionale



Toscana: anche nel 2013 tra le regioni italiane con più “migliori” (27%) e meno “peggiori” (9%)

Risultati in aree di alta rilevanza per la salute dei cittadini e la qualità dell’assistenza: alcune conferme

Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni (2013)

***In tutta la regione*:**

pari o inferiore alla media nazionale



Media nazionale: 9,2%

Fratture del collo del femore, intervento chirurgico entro 2 giorni (2013)

Anche nel 2013 in Toscana la tempestività dell'intervento è associata a mortalità bassa



22 su 24 ospedali sopra la media nazionale



Area Muscoloscheletrico

Colecistectomia in regime ordinario / day surgery: proporzione di laparoscopiche (2013)

I benefici dell'innovazione sono equamente distribuiti su tutto il territorio:
la tecnica laparoscopica viene ampiamente utilizzata in tutti i nostri ospedali.





Risultati in aree di alta rilevanza per la salute dei cittadini e la qualità dell’assistenza: alcuni progressi grazie alle attività di auditing interno

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni (2011-2013)

Gli audit a supporto del miglioramento: mortalità ridotta in tre ospedali tra il 2012 e il 2013

- Montepulciano 30,8% → 7,3 %
- Bagno a Ripoli 7,6% → 0%
- Prato 25,4% → 8,3%



Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni (2011-2013)





By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni (biennio 2012-2013)





Audit a supporto del miglioramento:
Se 4.7% di mortalità è la media del biennio, in realtà tra 2012 e 2013 c' è stata una importante riduzione (da 5,6% a 2,2%)