



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

---

# Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 114  
Sintesi nazionale

---

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)  
Dati relativi alla settimana 11/07/2022-17/07/2022  
(aggiornati al 20/07/2022)

---



## **Aggiornamento 20 luglio 2022 - Periodo di riferimento: 11/7/2022-17/7/2022**

### ***Headline della settimana:***

*Si inizia ad osservare una transizione della attuale fase epidemica. L'incidenza è molto elevata ma in diminuzione con una analoga riduzione della velocità di trasmissione. Persiste un lento aumento nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva.*

*In questa fase si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.*

*L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia.*



## Punti chiave:

- Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 11–17 luglio 2022 ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 e del periodo 15-21 luglio 2022 sulla base dei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute. Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati nella settimana 11–17 luglio 2022, hanno contratto l'infezione all'inizio di luglio 2022.
- **Inizia a diminuire l'incidenza:** I dati del flusso ISS nel periodo 11/07/2022-17/07/2022 evidenziano una incidenza in lieve diminuzione e pari a 1.054 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 1.089 per 100.000 abitanti nel periodo 04/07/2022-10/07/2022). Un trend in diminuzione si osserva anche nel periodo più recente censito nei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute (977 casi per 100.000 abitanti nel periodo 15/7/2022-21/7/2022 vs 1.158 casi per 100.000 abitanti nel periodo 8/7/2022-14/7/2022).
- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d'età 60-69 anni con un'incidenza pari a 1.206 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente. Al momento, l'incidenza più bassa si rileva nella fascia di età 0-9 anni con un'incidenza di 744 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente.
- Nel periodo 29 giugno – 12 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a **1,23 (range 1,16-1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma oltre la soglia epidemica**. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e a cavallo della soglia epidemica:  $R_t=1$  (0,98-1,02) al 12/07/2022 vs  $R_t=1,15$  (1,12-1,17) al 05/07/2022. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/primo-piano/-/asset\\_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037](https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037)).
- **Aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolato ai sensi del DM 30 aprile 2020** che si situa al 4,5% (413/9.203) il giorno 19/07/2022, rispetto al 4,1% (375/9.208) il giorno 12/07/2022. Il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva aumenta, passando da 375 (12/07/2022) a 413 (19/07/2022), con un aumento relativo del 10%.
- **Aumenta il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale:** era al 17,1% (10.975 /64.158) il giorno 19/07/2022, rispetto al 15,1% (9.724 /64.236) il giorno 12/07/2022. Il numero di persone ricoverate in queste aree è aumentato a 10.975 (19/07/2022) da 9.724 (12/07/2022) con un aumento relativo di circa il 13%.
- **Tre Regioni/PA sono classificate a rischio basso. Quattordici Regioni/PPAA sono classificate a rischio moderato ai sensi del DM del 30 aprile 2020 (cinque di queste ad alta probabilità di progressione), mentre 3 Regioni/PPAA sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza e una per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all'ISS.**
- **Dodici** Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. **Quattro** Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.
- La **percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente** (11%). In lieve aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (40,5% vs 39%), e in lieve diminuzione la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (48% vs 50%). L'attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza **non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi**, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento.
- Si inizia ad osservare una transizione della attuale fase epidemica. L'incidenza è molto elevata ma in diminuzione con una analoga riduzione della velocità di trasmissione. Persiste un lento aumento nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva.
- In questa fase si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
- **L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali**, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 20 luglio 2022 relativi alla settimana 11/7/2022-17/7/2022

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 06/07/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	18596	↑	↓	1.67 (CI: 1.59-1.74)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia	4	Moderata (ad alta probabilità di progressione)	No
Basilicata	7140	↑	↑	1.36 (CI: 1.15-1.6)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Moderata	No
Calabria	20124	↑	↑	1.58 (CI: 1.49-1.67)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	3	Moderata (ad alta probabilità di progressione)	No
Campania	75797	↓	↓	1.45 (CI: 1.43-1.47)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	3	Bassa	No
Emilia-Romagna	48604	↓	↑	1.24 (CI: 1.22-1.26)	No	Moderata	Bassa	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e ind 2.6 sottosoglia	2	Alta #	Si
FVG	9340	↓	↑	0.92 (CI: 0.89-0.93)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	1	Moderata	No
Lazio	64806	↓	↓	1.27 (CI: 1.23-1.31)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia	2	Bassa	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 06/07/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Liguria	15695	↑	↑	1.32 (CI: 1.3-1.34)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia	3	Moderata	No
Lombardia	86438	↑	↑	1.13 (CI: 1.12-1.14)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Moderata	No
Marche	18634	↑	↑	1.39 (CI: 1.33-1.46)	No	Moderata	Bassa	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e ind 2.6 sottosoglia	3	Alta #	Si
Molise	2881	↓	↓	0.92 (CI: 0.49-1.42)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Piemonte	30541	↑	↑	1.13 (CI: 1.05-1.22)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	2	Moderata	No
PA Bolzano/Bozen	5613	↑	↑	1.18 (CI: 1.13-1.21)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Moderata (ad alta probabilità di progressione)	No
PA Trento	5612	↑	↑	1.32 (CI: 1.27-1.37)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	3	Moderata (ad alta probabilità di progressione)	No
Puglia	50599	↓	↓	1.5 (CI: 1.47-1.52)	No	Bassa	Bassa	2 allerte di resilienza. Total risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia	3	Moderata #	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 06/07/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Sardegna	17134	↓	↑	<b>1 (CI: 0.96-1.05)</b>	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Moderata	No
Sicilia	33192	↓	↓	<b>1.25 (CI: 1.22-1.28)</b>	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Moderata	No
Toscana	36598	↓	↓	<b>1.18 (CI: 1.16-1.19)</b>	No	Non valutabile (equiparato a rischio alto)	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	Non valutabile (equiparato a rischio alto)##	Si
Umbria	11923	↓	↓	<b>1.15 (CI: 1.08-1.21)</b>	No	Moderata	Moderata	<b>1 allerte di resilienza.</b> Total risorse umane sottosoglia	2	Moderata (ad alta probabilità di progressione)	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	1174	↑	↑	<b>1.33 (CI: 1.14-1.53)</b>	No	Moderata	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e ind 2.6 sottosoglia	2	Alta #	No
Veneto	61165	↑	↑	<b>1.16 (CI: 1.16-1.16)</b>	No	Moderata	Bassa	<b>1 allerte di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia	2	Moderata	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

\*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

# presenza di molteplici allerte di resilienza;

## La classificazione di Non valutabile è equiparata alla valutazione di rischio Alto secondo il DM del 30 aprile 2020.



Ministero della Salute



## Dimensione 1 - completezza dei dati

### Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
<b>Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)</b>	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			

Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 20 luglio 2022 relativi alla settimana 11/7/2022-17/7/2022

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
<b>Abruzzo</b>	92.8	93.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	95.9
<b>Basilicata</b>	99.7	99.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Calabria</b>	98.6	99.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.9
<b>Campania</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.6
<b>Emilia-Romagna</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	97.2
<b>FVG</b>	99.8	99.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.9
<b>Lazio</b>	95.1	93.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	97.3
<b>Liguria</b>	85.8	85.4	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	93.5
<b>Lombardia</b>	94.3	95.2	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	96.9
<b>Marche</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Molise</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Piemonte</b>	74.8	71.1	Stabilmente sopra-soglia	99.7	100	96.4
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	99.6	99.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	96.8
<b>PA Trento</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	90.3
<b>Puglia</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Sardegna</b>	98.4	98.5	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Sicilia</b>	98.4	98.3	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.8
<b>Toscana</b>	47.2	<b>44.2</b>	<b>Sottosoglia</b>	100.0	100	99.9
<b>Umbria</b>	63.0	63.5	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.8
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	99.8	99.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.7
<b>Veneto</b>	75.5	74.7	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0





## Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

### Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
<b>Stabilità di trasmissione</b>	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e $\leq 1$ in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID- 19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione  Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact- tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
<b>Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi</b>	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



## Nota Metodologica

**NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto**

**Stima di Rt:** La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

**Valutazione del Rischio:** nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

**Dati sui focolai:** appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

**Casi importati:** La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

**Scenario settimanale di riferimento:** viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1$  e  $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1,25$  e  $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

**Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto:** Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione (in area medica e in terapia intensiva) sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

**Occupazione posti letto:** si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 20 luglio 2022 relativi alla settimana 11/7/2022-17/7/2022

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
<b>Abruzzo</b>	37692	<b>10.9</b>	<b>3.6</b>	<b>1.67 (CI: 1.59-1.74)</b>	401	12957	4%	21%
<b>Basilicata</b>	13385	<b>0.3</b>	<b>13.9</b>	<b>1.36 (CI: 1.15-1.6)</b>	4	230	0%	29%
<b>Calabria</b>	39988	<b>6.6</b>	<b>3.2</b>	<b>1.58 (CI: 1.49-1.67)</b>	94	1670	10%	34%
<b>Campania</b>	165280	-12.6	-14.8	<b>1.45 (CI: 1.43-1.47)</b>	6452	23110	6%	19%
<b>Emilia-Romagna</b>	98825	<b>3.1</b>	-2.3	<b>1.24 (CI: 1.22-1.26)</b>	0	45879	5%	19%
<b>FVG</b>	25807	<b>14.6</b>	-21.2#	0.92 (CI: 0.89-0.93)	1160	10936	4%	23%
<b>Lazio</b>	132490	-11.8	-14.5	<b>1.27 (CI: 1.23-1.31)</b>	1076	623	8%	16%
<b>Liguria</b>	30813	<b>7.4</b>	<b>7.2</b>	<b>1.32 (CI: 1.3-1.34)</b>	2855	3185	6%	26%
<b>Lombardia</b>	171392	<b>4</b>	<b>2.3</b>	<b>1.13 (CI: 1.12-1.14)</b>	2544	67527	2%	15%
<b>Marche</b>	39445	<b>6.4</b>	<b>4.2</b>	<b>1.39 (CI: 1.33-1.46)</b>	634	3364	3%	21%
<b>Molise</b>	5911	-5.4	-0.8	0.92 (CI: 0.49-1.42)	10	0	5%	10%
<b>Piemonte</b>	70672	<b>7.4</b>	<b>4.2#</b>	<b>1.13 (CI: 1.05-1.22)</b>	4070	17515	3%	9%
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	10084	<b>26.4</b>	<b>27.5</b>	<b>1.18 (CI: 1.13-1.21)</b>	455	3635	2%	21%
<b>PA Trento</b>	10075	<b>25</b>	<b>26.7</b>	<b>1.32 (CI: 1.27-1.37)</b>	695	2080	3%	19%
<b>Puglia</b>	107513	-7.4	-9.4	<b>1.5 (CI: 1.47-1.52)</b>	38	47967	4%	18%
<b>Sardegna</b>	36526	<b>5.6</b>	-5	<b>1 (CI: 0.96-1.05)</b>	1217	7034	5%	11%
<b>Sicilia</b>	165015	<b>64.9</b>	-35.6#	<b>1.25 (CI: 1.22-1.28)</b>	4473	48317	6%	28%
<b>Toscana</b>	67503	-3.8	-6	<b>1.18 (CI: 1.16-1.19)</b>	778	33878	5%	15%
<b>Umbria</b>	23737	<b>2.1</b>	-0.2	<b>1.15 (CI: 1.08-1.21)</b>	1	8449	8%	<b>43%</b>
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	2038	<b>38.9</b>	<b>31.9</b>	<b>1.33 (CI: 1.14-1.53)</b>	52	1165	8%	33%
<b>Veneto</b>	122797	<b>2.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1.16 (CI: 1.16-1.16)</b>	4564	31947	4%	12%

\*dato aggiornato al giorno 19/07/2022 (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore).

#Regioni/PPAA per cui è stato rilevato un numero molto inferiore di casi segnalati al flusso coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità rispetto a quanto contestualmente riportato dalla stessa Regione/PA al flusso aggregato coordinato dal Ministero della Salute. In particolare, si segnalano i seguenti disallineamenti con il flusso dei dati aggregati: Friuli-Venezia Giulia 32,2%; Sicilia 67,7% e Piemonte 16,5%.

## Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

### Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese*  *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione in setting ospedalieri/PS  Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS  VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
Possibilità di garantire adeguate risorse per contact- tracing, isolamento e quarantena	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Abruzzo</b>	35%	35%	0	Non calcolabile	0.7 per 10000	0.8 per 10000	1.4 per 10000	<b>70.8%</b>	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia
<b>Basilicata</b>	40%	33%	1	0	1.5 per 10000	4.6 per 10000	6.1 per 10000	92.4%	0 allerte di resilienza
<b>Calabria</b>	34%	32%	0	0	0.7 per 10000	1.3 per 10000	2 per 10000	91.4%	0 allerte di resilienza
<b>Campania</b>	39%	30%	1	1	0.7 per 10000	1.4 per 10000	2 per 10000	88.9%	0 allerte di resilienza
<b>Emilia-Romagna</b>	36%	<b>37%</b>	1	Non calcolabile	0.5 per 10000	0.8 per 10000	1.3 per 10000	<b>21%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e ind 2.6 sottosoglia
<b>FVG</b>	52%	<b>53%</b>	1	1	0.5 per 10000	0.8 per 10000	1.3 per 10000	87.8%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Lazio</b>	34%	33%	1	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	<b>67.1%</b>	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia
<b>Liguria</b>	24%	24%	0	0	0.3 per 10000	0.8 per 10000	1.1 per 10000	<b>86.2%</b>	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia
<b>Lombardia</b>	5%	4%	1	Non calcolabile	1 per 10000	0.9 per 10000	1.9 per 10000	98.5%	0 allerte di resilienza
<b>Marche</b>	37%	<b>41%</b>	0	0	0.1 per 10000	0.1 per 10000	<b>0.2 per 10000</b>	100%	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e ind 2.6 sottosoglia
<b>Molise</b>	32%	30%	0	0	1.1 per 10000	2.7 per 10000	3.8 per 10000	100%	0 allerte di resilienza

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Piemonte</b>	43%	<b>45%</b>	1	Non calcolabile	0.6 per 10000	0.8 per 10000	1.4 per 10000	<b>66.3%</b>	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	12%	10%	0	0	1.1 per 10000	1.1 per 10000	2.1 per 10000	94.2%	0 allerte di resilienza
<b>PA Trento</b>	47%	<b>49%</b>	1	1	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
<b>Puglia</b>	61%	59%	0	0	0.3 per 10000	0.5 per 10000	<b>0.7 per 10000</b>	<b>47.3%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Total risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia
<b>Sardegna</b>	52%	50%	0	1	0.1 per 10000	1.1 per 10000	1.3 per 10000	99.6%	0 allerte di resilienza
<b>Sicilia</b>	27%	19%	0	Non calcolabile	1 per 10000	2.2 per 10000	3.3 per 10000	92.7%	0 allerte di resilienza
<b>Toscana</b>	93%	<b>94%</b>	0	1	0.1 per 10000	0.8 per 10000	1 per 10000	94.8%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Umbria</b>	50%	50%	2	2	0.4 per 10000	0 per 10000	<b>0.5 per 10000</b>	91.1%	<b>1 allerte di resilienza.</b> Total risorse umane sottosoglia
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	36%	<b>38%</b>	2	2	0.5 per 10000	1.3 per 10000	1.8 per 10000	<b>76.8%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e ind 2.6 sottosoglia
<b>Veneto</b>	31%	31%	1	1	1 per 10000	1.8 per 10000	2.9 per 10000	<b>52.4%</b>	<b>1 allerte di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia

\*le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

\*\* in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

#Come concordato con le Regioni/PPAA (specificato in Verbale Cabina di Regia del 16/7/2021), si considera il trend dell'indicatore 2.1 con % di positività arrotondata al suo valore intero più prossimo.

*Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13*

**Aggiornamento del 21/07/2022**

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop- Periodo di riferimento 1-7 luglio 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop- Periodo di riferimento 08-14 luglio 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop- Periodo di riferimento 15-21 luglio 2022	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 21/07/2022	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 21/07/2022
Abruzzo	1291,6	1546,8	1421,3	19,8%	4,4%
Basilicata	1101,5	1280,7	1095,6	30,1%	0,0%
Calabria	931,9	1127	1076,6	32,9%	9,5%
Campania	1482,5	1540,5	1135,3	18,5%	4,4%
Emilia Romagna	1045,9	1137,3	1008,9	19,3%	4,7%
Friuli Venezia Giulia	946,2	1101,9	1088,8	22,6%	4,6%
Lazio	1250,9	1174	916,6	16,8%	5,8%
Liguria	908,1	1057,1	957,3	26,8%	6,2%
Lombardia	815,9	882,4	776,8	14,7%	2,3%
Marche	1133,2	1366,9	1235,6	19,8%	3,0%
Molise	972,2	1055,5	882,8	10,8%	2,6%
PA di Bolzano	778,5	979,9	1045,8	19,8%	3,0%
PA di Trento	752,7	952,5	961,0	17,0%	3,3%
Piemonte	718,5	867,6	769,9	9,2%	2,5%
Puglia	1320,5	1421,9	1104,3	17,6%	3,2%
Sardegna	1125,5	1175,5	983,7	10,6%	4,4%
Sicilia *	1147,5	1228,7	957,3	26,8%	6,0%
Toscana	894,4	928,6	789,2	15,2%	4,6%
Umbria	1275,8	1454,3	1257,6	42,4%	4,7%
Valle d'Aosta	580,5	849,7	981,1	31,3%	5,9%
Veneto	1184,8	1302,9	1167,9	12,8%	3,4%
<b>ITALIA</b>	<b>1071</b>	<b>1158</b>	<b>977</b>	<b>17,1%</b>	<b>4,1%</b>

**Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile**

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 in merito agli indicatori individuati per la valutazione della necessità di applicazione di misure di contenimento e controllo dell'epidemia da SARS-CoV-2, si comunica che nel corso della riunione del 24 settembre 2021, la Cabina di Regia per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui all'allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al D.M. Salute 30 aprile 2020, in considerazione della verificata stabilità dei flussi relativi all'occupazione dei posti letto di Area Medica e di Terapia Intensiva e dell'opportunità di riferirsi al dato quanto più possibile aggiornato, ha ritenuto opportuno prendere a riferimento per la valutazione settimanale i dati riferiti alla giornata del giovedì antecedente la riunione di monitoraggio, che si svolge ogni venerdì. Qualora non disponibili, si utilizzeranno i dati più recenti.

\*numero di "Nuovi casi nei 7 giorni precedenti" è stato ottenuto sottraendo n. 3.532 casi dalla differenza dei totali cumulativi dei giorni 21/07/2022 e 14/07/2022.