



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

---

# Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 125  
Sintesi nazionale

---

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)  
Dati relativi alla settimana 26/09/2022-02/10/2022  
(aggiornati al 05/10/2022)

---



## **Aggiornamento 05 ottobre 2022 - Periodo di riferimento: 26/9/2022-02/10/2022**

### ***Headline della settimana:***

*Si osserva un ulteriore aumento dell'incidenza. La trasmissibilità è in aumento e sopra la soglia epidemica nel periodo 14-27 settembre 2022. L'impatto sugli ospedali è ancora limitato ma sono in lieve aumento i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed in aumento quelli in area medica.*

*Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.*

*L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia.*



## Punti chiave:

- Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 26 settembre – 2 ottobre 2022 ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 e del periodo 30 settembre – 6 ottobre 2022 sulla base dei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute. Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati nella settimana 30 settembre-6 ottobre 2022, hanno contratto l'infezione nella seconda metà di settembre 2022.
- **Incidenza in aumento:** I dati del flusso ISS nel periodo 26/09/2022-02/10/2022 evidenziano una incidenza in aumento e pari a 383 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 241 per 100.000 abitanti nel periodo 19/09/2022-25/09/2022. Anche nel periodo più recente censito nei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute si osserva un aumento (441 nel periodo 30/9/2022-6/10/2022 vs 325 casi per 100.000 abitanti nel periodo 23/9/2022-29/9/2022).
- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d'età 50-59 anni con un'incidenza pari a 474 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Rallenta la crescita nelle fasce d'età più giovani, mentre accelera in quelle più avanzate. L'età mediana alla diagnosi è di 51 anni, in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti (dati flusso ISS).
- Nel periodo 14 settembre–27 settembre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a **1,18 (range 0,98-1,52), in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore al valore soglia**. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ed oltre la soglia epidemica:  $R_t=1,28$  (1,23-1,32) al 27/09/2022 vs  $R_t=0,95$  (0,90-1,00) al 20/09/2022. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/primo-piano/-/asset\\_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037](https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037)).
- **In lieve aumento il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva a livello nazionale:** In lieve aumento il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolato ai sensi del DM 30 aprile 2020 che si situa all'1,7% (155/9.212) il giorno 04/10/2022, rispetto all'1,4% (128/9.205) il giorno 27/09/2022. Il numero di persone ricoverate in queste aree è aumentato da 128 (20/09/2022) a 155 (04/10/2022) con un aumento relativo del 21,1%. Tale aumento è confermato dal tasso di occupazione calcolato dal Ministero della Salute ai sensi del DL 105/2021 relativo ad una data di poco successiva (6 ottobre 2022) che era pari a 1,8% vs 1,4% al 29 settembre 2022.
- **In aumento il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale:** era al 7,6% (4.814/63.679) il giorno 04/10/2022, rispetto al 5,7% (3.653/63.698) il giorno 27/09/2022. Il numero di persone ricoverate in queste aree è aumentato da 3.653 (20/09/2022) a 4.814 (04/10/2022) con un aumento relativo del 31,8%. Un aumento si osserva anche nel tasso di occupazione calcolato dal Ministero della Salute ai fini degli indicatori decisionali ai sensi del DL 105/2021 relativi ad una data di poco successiva (06 ottobre 2022) che era pari al 8,2% vs 6,0% al 29 settembre 2022.
- **Sei Regioni/PPAA sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza, una Regione è non valutabile, status equiparabile al rischio alto, ai sensi del DM del 30 aprile 2020; le restanti 14 sono a rischio moderato.**
- **Tutte le** Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. **Sette** Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.
- La **percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente** (12% vs 11%). Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (53% vs 54%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% vs 35%). L'attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza **non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi**, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento.
- Si osserva un ulteriore aumento dell'incidenza. La trasmissibilità è in aumento e sopra la soglia epidemica nel periodo 14-27 settembre 2022. L'impatto sugli ospedali è ancora limitato ma sono in lieve aumento i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed in aumento quelli in area medica.
- Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
- **L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali**, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 05 ottobre 2022 relativi alla settimana 26/9/2022-02/10/2022

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 21/09/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	6975	↑	↑	<b>1.01 (CI: 0.95-1.06)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia.	1	<b>Alta #</b>	No
Basilicata	1577	↑	↑	<b>1.47 (CI: 0.96-2.11)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Calabria	5395	↑	↑	0.92 (CI: 0.83-1.02)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Campania	14346	↑	↑	<b>1.15 (CI: 1.1-1.19)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b>	No
Emilia-Romagna	18839	↑	↑	<b>1.14 (CI: 1.09-1.19)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia.	2	<b>Alta</b> (ad alta probabilità di progressione) <b>#</b>	No
FVG	7006	↑	↑	<b>1.18 (CI: 1.13-1.2)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b> (ad alta probabilità di progressione)	No
Lazio	21035	↑	↑	<b>1.24 (CI: 1.19-1.28)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia.	2	<b>Alta #</b>	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 21/09/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Liguria	5861	↑	↑	<b>1.02 (CI: 0.98-1.06)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Lombardia	41482	↑	↓	<b>1.24 (CI: 1.21-1.27)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b>	No
Marche	7224	↑	↑	<b>1.08 (CI: 1.01-1.15)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> In 2.1 in aumento e 'Totale risorse umane' sottosoglia	2	<b>Alta</b> (ad alta probabilità di progressione) <b>#</b>	No
Molise	849	↑	↑	0.42 (CI: 0.14-0.84)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Piemonte	18099	↑	↑	<b>1.31 (CI: 1.11-1.52)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b>	No
PA Bolzano/Bozen	3756	↑	↑	<b>1.23 (CI: 1.17-1.3)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b> (ad alta probabilità di progressione)	No
PA Trento	4030	↑	↑	<b>1.27 (CI: 1.21-1.34)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b> (ad alta probabilità di progressione)	No
Puglia	8145	↑	↑	<b>1.05 (CI: 0.99-1.11)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>3 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento, Ind 2.6 e 'Totale risorse umane' sottosoglia	1	<b>Alta #</b>	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 21/09/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Sardegna	3119	↑	↑	0.97 (CI: 0.87-1.08)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Sicilia	6443	↑	↑	<b>1.13 (CI: 1.06-1.19)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b>	No
Toscana	14684	↑	↑	<b>1.12 (CI: 1.08-1.16)</b>	No	<b>Non valutabile</b>	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e 'Totale risorse umane' sottosoglia	2	<b>Non valutabile</b> (equiparato a rischio alto e ad alta probabilità di progressione)	No
Umbria	5173	↑	↓	<b>1.28 (CI: 1.12-1.45)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	<b>Moderata</b> (ad alta probabilità di progressione)	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	478	↑	↑	<b>1.16 (CI: 0.9-1.48)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Veneto	31490	↑	↑	<b>1.19 (CI: 1.17-1.2)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia	2	<b>Alta #</b>	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

\*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

# presenza di molteplici allerte di resilienza;



**Dimensione 1 - completezza dei dati**

**Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:**

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
<b>Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)</b>	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			

Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 05 ottobre 2022 relativi alla settimana 26/9/2022-02/10/2022

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
<b>Abruzzo</b>	98.9	98.7	Stabilmente sopra-soglia	99.7	100	98.2
<b>Basilicata</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	NaN	NaN	100.0
<b>Calabria</b>	98.4	97.7	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Campania</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.7
<b>Emilia-Romagna</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	97.8
<b>FVG</b>	99.5	99.5	Stabilmente sopra-soglia	99.7	100	99.8
<b>Lazio</b>	97.6	97.5	Stabilmente sopra-soglia	99.8	100	97.3
<b>Liguria</b>	79.4	75.3	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	96.0
<b>Lombardia</b>	94.2	92.6	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	97.7
<b>Marche</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Molise</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Piemonte</b>	71.5	68.7	Stabilmente Sopra soglia	99.8	100	97.7
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	99.9	99.9	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	97.3
<b>PA Trento</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	96.1
<b>Puglia</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Sardegna</b>	96.6	96.5	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Sicilia</b>	97.8	96.3	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Toscana</b>	70.1	<b>59.6</b>	<b>Sotto soglia</b>	100.0	100	99.8
<b>Umbria</b>	64.3	62.8	Appena sopra-soglia	100.0	100	99.8
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	99.7	99.2	Stabilmente sopra-soglia	100.0	NaN	99.8
<b>Veneto</b>	88.5	82.1	Stabilmente sopra-soglia	99.8	100	100.0





## Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

### Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
<b>Stabilità di trasmissione</b>	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e $\leq 1$ in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione  Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact-tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci-sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
<b>Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi</b>	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



## Nota Metodologica

**NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto**

**Stima di Rt:** La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

**Valutazione del Rischio:** nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

**Dati sui focolai:** appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

**Casi importati:** La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

**Scenario settimanale di riferimento:** viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1$  e  $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1,25$  e  $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

**Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto:** Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione (in area medica e in terapia intensiva) sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

**Occupazione posti letto:** si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 05 ottobre 2022 relativi alla settimana 26/9/2022-02/10/2022

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	11284	<b>59.6</b>	<b>53.1</b>	<b>1.01 (CI: 0.95-1.06)</b>	432	5055	1%	11%
Basilicata	2383	<b>42.4</b>	<b>35.5</b>	<b>1.47 (CI: 0.96-2.11)</b>	12	75	0%	7%
Calabria	9327	<b>43.8</b>	<b>39.4</b>	0.92 (CI: 0.83-1.02)	22	337	3%	14%
Campania	25379	<b>27.7</b>	<b>29.5</b>	<b>1.15 (CI: 1.1-1.19)</b>	1625	3556	1%	7%
Emilia-Romagna	27381	<b>88.9</b>	<b>83.1</b>	<b>1.14 (CI: 1.09-1.19)</b>	0	17722	2%	8%
FVG	11132	<b>73.8</b>	<b>68.7</b>	<b>1.18 (CI: 1.13-1.2)</b>	1145	4760	5%	15%
Lazio	33093	<b>50.3</b>	<b>52.5</b>	<b>1.24 (CI: 1.19-1.28)</b>	664	929	3%	7%
Liguria	9232	<b>65.2</b>	<b>64.9</b>	<b>1.02 (CI: 0.98-1.06)</b>	977	1344	3%	9%
Lombardia	67028	<b>57.4</b>	<b>66.4</b>	<b>1.24 (CI: 1.21-1.27)</b>	632	30216	1%	7%
Marche	11345	<b>88.7</b>	<b>79.8</b>	<b>1.08 (CI: 1.01-1.15)</b>	201	1018	0%	8%
Molise	1450	<b>28.7</b>	<b>30.0</b>	0.42 (CI: 0.14-0.84)	24	0	0%	5%
Piemonte	34209	<b>80.8</b>	<b>43.3</b>	<b>1.31 (CI: 1.11-1.52)</b>	2498	9932	1%	7%
PA Bolzano/Bozen	6351	<b>62.2</b>	<b>52.3</b>	<b>1.23 (CI: 1.17-1.3)</b>	309	1478	2%	23%
PA Trento	6558	<b>57.4</b>	<b>54.0</b>	<b>1.27 (CI: 1.21-1.34)</b>	569	1580	4%	13%
Puglia	13655	<b>46.3</b>	<b>45.9</b>	<b>1.05 (CI: 0.99-1.11)</b>	24	7561	2%	5%
Sardegna	5528	<b>23.1</b>	<b>26.3</b>	0.97 (CI: 0.87-1.08)	220	1381	0%	4%
Sicilia	14477	<b>21.6</b>	<b>80.5</b>	<b>1.13 (CI: 1.06-1.19)</b>	641	5058	2%	6%
Toscana	18933	<b>78.7</b>	<b>67.8</b>	<b>1.12 (CI: 1.08-1.16)</b>	380	12288	2%	6%
Umbria	7872	<b>57.3</b>	<b>61.6</b>	<b>1.28 (CI: 1.12-1.45)</b>	2	3754	3%	20%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	621	<b>116.8</b>	<b>140.2</b>	<b>1.16 (CI: 0.9-1.48)</b>	24	490	0%	15%
Veneto	50998	<b>59.1</b>	<b>56.9</b>	<b>1.19 (CI: 1.17-1.2)</b>	1948	11634	2%	7%

\*dato aggiornato al giorno 04/10/2022 (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore).

#Regioni/PPAA per cui è stato rilevato un numero molto inferiore di casi segnalati al flusso coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità rispetto a quanto contestualmente riportato dalla stessa Regione/PA al flusso aggregato coordinato dal Ministero della Salute. In particolare, si segnalano i seguenti disallineamenti con il flusso dei dati aggregati: Piemonte 17,8%.

## Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

### Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese*  *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione in setting ospedalieri/PS  Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS  VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
Possibilità di garantire adeguate risorse per contact- tracing, isolamento e quarantena	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Abruzzo</b>	22%	<b>26%</b>	1	0	0.6 per 10000	0.7 per 10000	1.3 per 10000	<b>70.4%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia.
<b>Basilicata</b>	19%	<b>25%</b>	1.5	0	1.6 per 10000	4.5 per 10000	6.1 per 10000	94%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Calabria</b>	16%	<b>19%</b>	0	0	0.7 per 10000	1.3 per 10000	2 per 10000	91.4%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Campania</b>	17%	<b>20%</b>	1	1	0.6 per 10000	1.2 per 10000	1.9 per 10000	93.8%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Emilia-Romagna</b>	18%	<b>25%</b>	2	Non calcolabile	0.4 per 10000	0.7 per 10000	1.1 per 10000	<b>20.3%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia.
<b>FVG</b>	36%	<b>47%</b>	1	1	0.5 per 10000	0.7 per 10000	1.2 per 10000	99.5%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Lazio</b>	12%	<b>14%</b>	0	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	<b>47.1%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia.
<b>Liguria</b>	11%	<b>16%</b>	0	0	0.3 per 10000	0.8 per 10000	1.1 per 10000	86.2%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Lombardia</b>	2%	<b>3%</b>	1	Non calcolabile	0.9 per 10000	0.9 per 10000	1.8 per 10000	98.2%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Marche</b>	24%	<b>26%</b>	0	0	0.1 per 10000	0.1 per 10000	<b>0.2 per 10000</b>	100%	<b>2 allerte di resilienza.</b> In 2.1 in aumento e 'Totale risorse umane' sottosoglia
<b>Molise</b>	18%	<b>21%</b>	0.5	0.5	1.1 per 10000	2.7 per 10000	3.8 per 10000	100%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Piemonte</b>	29%	<b>37%</b>	1	Non calcolabile	0.5 per 10000	0.6 per 10000	1.1 per 10000	79%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	4%	<b>5%</b>	0	0	0.9 per 10000	0.9 per 10000	1.8 per 10000	94%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>PA Trento</b>	41%	<b>45%</b>	1	1	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Puglia</b>	29%	<b>35%</b>	0	0	0.3 per 10000	0.5 per 10000	<b>0.7 per 10000</b>	<b>47.3%</b>	<b>3 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento, Ind 2.6 e 'Totale risorse umane' sottosoglia
<b>Sardegna</b>	20%	<b>21%</b>	0	Non calcolabile	0.1 per 10000	1.3 per 10000	1.4 per 10000	99.4%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Sicilia</b>	10%	<b>12%</b>	1	Non calcolabile	0.9 per 10000	2.3 per 10000	3.2 per 10000	93.7%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Toscana</b>	49%	<b>83%</b>	0	0	0.1 per 10000	0.9 per 10000	<b>0.9 per 10000</b>	89.4%	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e 'Totale risorse umane' sottosoglia
<b>Umbria</b>	28%	<b>34%</b>	2	2	0.3 per 10000	0.6 per 10000	1 per 10000	93.1%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	23%	<b>33%</b>	2	2	0.4 per 10000	0.7 per 10000	1.1 per 10000	99%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Veneto</b>	15%	<b>21%</b>	1	1	1 per 10000	1.8 per 10000	2.9 per 10000	<b>73.9%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 sottosoglia

\*le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

\*\* in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

\*\*\* a seguito di una verifica da parte della regione il valore dell'indicatore 2.6 è stato aggiornato.

#Come concordato con le Regioni/PPAA (specificato in Verbale Cabina di Regia del 23/7/2021), si considera il trend dell'indicatore 2.1 con % di positività arrotondata al suo valore intero più prossimo.

*Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13*

**Aggiornamento del 06/10/2022**

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 16-22 settembre 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 23-29 settembre 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 30 settembre-06 ottobre 2022	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 06/10/2022	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 06/10/2022
Abruzzo	327,5	461,3	603,8	10,6%	0,0%
Basilicata	187,0	218,1	254,3	7,1%	0,0%
Calabria	197,5	263,3	309,7	13,1%	2,6%
Campania	194,3	229,4	261,5	6,7%	1,4%
Emilia Romagna	188,7	314,5	490,3	8,9%	2,0%
Friuli Venezia Giulia	300,3	486,7	710,0	16,9%	4,6%
Lazio	208,0	299,3	385,1	7,4%	2,5%
Liguria	212,0	321,3	443,4	8,6%	2,2%
Lombardia	215,2	348,3	490,3	7,8%	0,7%
Marche	236,0	407,8	537,1	8,0%	0,4%
Molise	198,1	241,4	321,9	5,7%	0,0%
PA di Bolzano	399,8	637,6	863,8	24,6%	3,0%
PA di Trento	417,6	633,0	825,2	14,3%	5,6%
Piemonte	256,6	417,4	654,7	8,4%	2,7%
Puglia	131,9	181,0	220,6	4,6%	1,3%
Sardegna	146,8	186,0	225,1	3,9%	1,5%
Sicilia	131,0	149,7	175,0	5,9%	1,5%
Toscana	160,2	273,6	395,3	6,2%	2,5%
Umbria	317,3	498,0	680,6	21,6%	5,5%
Valle d'Aosta	141,1	253,0	565,1	16,4%	0,0%
Veneto	346,2	557,0	728,9	8,2%	2,0%
<b>ITALIA</b>	<b>215</b>	<b>325</b>	<b>441</b>	<b>8,2%</b>	<b>1,8%</b>

**Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile**

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 in merito agli indicatori individuati per la valutazione della necessità di applicazione di misure di contenimento e controllo dell'epidemia da SARS-CoV-2, si comunica che nel corso della riunione del 24 settembre 2021, la Cabina di Regia per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui all'allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al D.M. Salute 30 aprile 2020, in considerazione della verificata stabilità dei flussi relativi all'occupazione dei posti letto di Area Medica e di Terapia Intensiva e dell'opportunità di riferirsi al dato quanto più possibile aggiornato, ha ritenuto opportuno prendere a riferimento per la valutazione settimanale i dati riferiti alla giornata del giovedì antecedente la riunione di monitoraggio, che si svolge ogni venerdì. Qualora non disponibili, si utilizzeranno i dati più recenti.