



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 136
Sintesi nazionale

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 12/12/2022-18/12/2022
(aggiornati al 21/12/2022)



Aggiornamento 21 dicembre 2022 - Periodo di riferimento: 12/12/2022-18/12/2022

Headline della settimana:

Si conferma il trend in diminuzione dell'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Rimane contenuto l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione nelle aree mediche mentre è stabile in terapia intensiva.

Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.

L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia.



Punti chiave:

- Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 12–18 dicembre 2022 ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 e del periodo 16–22 dicembre 2022 sulla base dei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute. Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati hanno contratto l'infezione nella prima decade di dicembre 2022.
- **Incidenza in ulteriore diminuzione:** I dati del flusso ISS nel periodo 12/12/2022-18/12/2022 evidenziano una incidenza in diminuzione e pari a 270 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 322 per 100.000 abitanti nel periodo 05/12/2022-11/12/2022. Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute l'incidenza è in diminuzione (233 nel periodo 16/12/2022-22/12/2022 vs 296 nel periodo 9/12/2022-14/12/2022).
- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d'età 90+ anni con un'incidenza pari a 455 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. In diminuzione l'incidenza settimanale in tutte le fasce di età. L'età mediana alla diagnosi è di 56 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti (dati flusso ISS).
- Nel periodo 30 novembre–13 dicembre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a **0,91 (range 0,83-0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica**. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e anch'esso sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,88-0,94) al 13/12/2022 vs Rt=0,98 (0,96-1,01) al 6/12/2022. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037).
- **Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva a livello nazionale:** il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolato ai sensi del DM 30 aprile 2020 si situa al 3,7% (339/9.176) il giorno 20/12/2022, rispetto al 3,6% (326/9.175) il giorno 13/12/2022. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve aumento da 326 (13/12/2022) a 339 (20/12/2022), con un aumento relativo del 3,9%. È sostanzialmente stabile anche il tasso di occupazione calcolato dal Ministero della Salute ai sensi del DL 105/2021 relativo ad una data di poco successiva (22 dicembre 2022) che era pari a 3,1% vs 3,2% al 15 dicembre 2022.
- **In diminuzione il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale:** era al 14,1% (9.004/63.760) il giorno 20/12/2022, rispetto al 15,1% (9.602/63.784) il giorno 13/12/2022. Il numero di persone ricoverate in queste aree è diminuito da 9.602 (13/12/2022) a 9.004 (20/12/2022) con una diminuzione relativa del 6,2%. In diminuzione anche il tasso di occupazione calcolato dal Ministero della Salute ai fini degli indicatori decisionali ai sensi del DL 105/2021 relativi ad una data di poco successiva (22 dicembre 2022) che era pari al 13,7% vs 14,8% al 15 dicembre 2022.
- **Una Regione è classificata a rischio alto per molteplici allerte di resilienza ai sensi del DM del 30 aprile 2020; quattro sono a rischio moderato e sedici classificate a rischio basso. Nove Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Due Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.**
- Si conferma il trend in diminuzione dell'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Rimane contenuto l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione nelle aree mediche mentre è stabile in terapia intensiva.
- Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
- L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 21 dicembre 2022 relativi alla settimana 12/11/2022-18/12/2022

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 07/12/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	5085	-19.7	-85	0.9 (CI: 0.86-0.96)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia	1	Bassa	No
Basilicata	1134	-1.9	-2	1.38 (CI: 0.94-1.88)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Calabria	4418	-3.7	2	1.15 (CI: 1.07-1.25)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Moderata	No
Campania	13884	-13.1	-281	1.05 (CI: 1.01-1.08)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Bassa	No
Emilia-Romagna	13743	-23.9	12	0.86 (CI: 0.83-0.89)	No	Bassa	Bassa	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia	1	# Moderata	No
FVG	3799	-22.7	-52	0.91 (CI: 0.89-0.93)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Lazio	14621	-21.9	-497	0.82 (CI: 0.78-0.86)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia	1	Bassa	No
Liguria	5178	-19.9	-98	1.03 (CI: 1.01-1.05)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	2	Bassa	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 07/12/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Lombardia	24490	-15.1	-204	0.76 (CI: 0.75-0.78)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Marche	5478	-19.1	-34	1.12 (CI: 1.05-1.18)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	2	Bassa	No
Molise	752	-7.7	0	0.98 (CI: 0.47-1.72)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Piemonte	8651	-30.0	-856	0.79 (CI: 0.66-0.92)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
PA Bolzano/Bozen	605	-12.6	-32	0.84 (CI: 0.78-0.92)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
PA Trento	923	-16.2	-58	0.8 (CI: 0.75-0.85)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Puglia	9412	-11.8	41	1.19 (CI: 1.16-1.23)	No	Moderata	Bassa	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia	2	# Alta	Si
Sardegna	3577	8.3	14	0.81 (CI: 0.76-0.87)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Moderata	No
Sicilia	10812	0.4	-1271	1.04 (CI: 0.99-1.08)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Moderata	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 07/12/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Toscana	8751	-26.2	4	0.9 (CI: 0.85-0.92)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Umbria	2603	-16.2	2	0.88 (CI: 0.79-0.98)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	1	Bassa	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	241	-13.3	-1	0.53 (CI: 0.42-0.65)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	1	Bassa	No
Veneto	21386	-13.8	4632	0.83 (CI: 0.82-0.83)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia	1	Bassa	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

presenza di molteplici allerte di resilienza;



Ministero della Salute



Dimensione 1 - completezza dei dati

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			



Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 21 dicembre 2022 relativi alla settimana 12/11/2022-18/12/2022

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
Abruzzo	98.5	98.6	Sopra soglia	100.0	100	98.7
Basilicata	97.9	98.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Calabria	99.4	99.3	Sopra soglia	99.8	100	100.0
Campania	99.9	100.0	Sopra soglia	100.0	100	99.8
Emilia-Romagna	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	98.3
FVG	98.9	98.9	Sopra soglia	100.0	100	99.8
Lazio	97.4	97.2	Sopra soglia	100.0	100	94.5
Liguria	76.0	75.5	Sopra soglia	99.8	100	97.7
Lombardia	91.1	90.6	Sopra soglia	100.0	100	97.6
Marche	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Molise	97.6	97.5	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Piemonte	74.3	84.4	Sopra soglia	99.8	100	97.8
PA Bolzano/Bozen	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	99.2
PA Trento	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	96.1
Puglia	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Sardegna	99.0	99.3	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Sicilia	97.6	97.3	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Toscana	74.6	77.1	Sopra soglia	100.0	100	99.9
Umbria	78.3	77.0	Sopra soglia	100.0	100	99.9
V.d'Aosta/V.d'Aoste	98.9	99.0	Sopra soglia	100.0	100	99.9
Veneto	90.4	91.6	Sopra soglia	100.0	100	100.0



Ministero della Salute



Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Stabilità di trasmissione	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e ≤ 1 in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID- 19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact- tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



Nota Metodologica

NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto

Stima di Rt: La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

Valutazione del Rischio: nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

Dati sui focolai: appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

Casi importati: La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

Scenario settimanale di riferimento: viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1$ e $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1,25$ e $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto: Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione (in area medica e in terapia intensiva) sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

Occupazione posti letto: si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 21 dicembre 2022 relativi alla settimana 12/11/2022-18/12/2022

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	12287	-14.1	-19.7	0.9 (CI: 0.86-0.96)	548	3438	4%	17%
Basilicata	1961	-0.5	-1.9	1.38 (CI: 0.94-1.88)	9	70	0%	14%
Calabria	9137	3.4	-3.7	1.15 (CI: 1.07-1.25)	20	465	11%	19%
Campania	30409	-9.1	-13.1	1.05 (CI: 1.01-1.08)	1069	4066	3%	10%
Emilia-Romagna	33330	-21.5	-23.9	0.86 (CI: 0.83-0.89)	4	12826	6%	19%
FVG	8998	-21.2	-22.7	0.91 (CI: 0.89-0.93)	537	3204	5%	21%
Lazio	34543	-22.2	-21.9	0.82 (CI: 0.78-0.86)	193	580	3%	11%
Liguria	12285	-19.8	-19.9	1.03 (CI: 1.01-1.05)	821	1961	5%	30%
Lombardia	54237	-13.5	-15.1	0.76 (CI: 0.75-0.78)	326	19705	3%	13%
Marche	13040	-16.5	-19.1	1.12 (CI: 1.05-1.18)	154	628	2%	21%
Molise	1548	-4.8	-7.7	0.98 (CI: 0.47-1.72)	21	0	3%	6%
Piemonte	23482	-26.5	-30.0	0.79 (CI: 0.66-0.92)	725	4170	2%	9%
PA Bolzano/Bozen	1351	-14.9	-12.6	0.84 (CI: 0.78-0.92)	42	465	1%	6%
PA Trento	2042	-16.0	-16.2	0.8 (CI: 0.75-0.85)	105	556	0%	11%
Puglia	20309	-8.5	-11.8	1.19 (CI: 1.16-1.23)	18	8950	2%	11%
Sardegna	7059	19.0	8.3	0.81 (CI: 0.76-0.87)	99	1084	3%	7%
Sicilia	22797	3.3	0.4	1.04 (CI: 0.99-1.08)	883	7982	4%	15%
Toscana	21657	-24.6	-26.2	0.9 (CI: 0.85-0.92)	220	8798	4%	11%
Umbria	5740	-13.4	-16.2	0.88 (CI: 0.79-0.98)	6	1726	9%	37%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	491	-24.0	-13.3	0.53 (CI: 0.42-0.65)	2	287	0%	31%
Veneto	46769	-14.3	-13.8	0.83 (CI: 0.82-0.83)	754	5762	4%	15%

*dato aggiornato al giorno 20/12/2022 (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore).

Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese* *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione in setting ospedalieri/PS Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
Possibilità di garantire adeguate risorse per contact- tracing, isolamento e quarantena	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
Abruzzo	28%	27%	1	Non calcolabile	0.6 per 10000	0.7 per 10000	1.3 per 10000	67.8%	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia
Basilicata	23%	22%	2	0	1.6 per 10000	4.3 per 10000	5.9 per 10000	93%	0 allerte di resilienza
Calabria	19%	19%	0	0	0.6 per 10000	1.1 per 10000	1.7 per 10000	91.3%	0 allerte di resilienza
Campania	21%	19%	1	1	0.4 per 10000	0.6 per 10000	1 per 10000	87.4%	0 allerte di resilienza
Emilia-Romagna	31%	27%	2	Non calcolabile	0.4 per 10000	0.5 per 10000	0.9 per 10000	21%	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia
FVG	41%	38%	2	1	0.8 per 10000	0.9 per 10000	1.6 per 10000	97.7%	0 allerte di resilienza
Lazio	20%	19%	1	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	71%	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia
Liguria	17%	13%	0	0	0.2 per 10000	0.5 per 10000	0.7 per 10000	77%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia
Lombardia	2%	2%	1	Non calcolabile	0.6 per 10000	0.6 per 10000	1.2 per 10000	98.3%	0 allerte di resilienza
Marche	39%	33%	0	0	0.1 per 10000	0.1 per 10000	0.1 per 10000	100%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
Molise	28%	24%	-0.5	-0.5	1.1 per 10000	2.7 per 10000	3.8 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
Piemonte	33%	24%	1	Non calcolabile	0.5 per 10000	0.6 per 10000	1.1 per 10000	84.6%	0 allerte di resilienza
PA Bolzano/Bozen	5%	3%	0	0	0.7 per 10000	0.4 per 10000	1.1 per 10000	97%	0 allerte di resilienza
PA Trento	26%	24%	2	2	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
Puglia	46%	39%	0	0	0.3 per 10000	0.5 per 10000	0.7 per 10000	47.3%	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia
Sardegna	32%	31%	0	Non calcolabile	0 per 10000	1 per 10000	1.1 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
Sicilia	16%	15%	1	1	1 per 10000	1.7 per 10000	2.8 per 10000	92.3%	0 allerte di resilienza
Toscana	68%	48%	0	1	0.1 per 10000	0.9 per 10000	1 per 10000	78.3%	0 allerte di resilienza
Umbria	29%	28%	2	2	0.1 per 10000	0.7 per 10000	0.9 per 10000	92.3%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia
V.d'Aosta/V.d'Aoste	26%	22%	2	2	0.3 per 10000	0.5 per 10000	0.8 per 10000	98.2%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia
Veneto	18%	15%	1	1	1 per 10000	1.8 per 10000	2.9 per 10000	67.9%	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia

*le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

** in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

#Come concordato con le Regioni/PPAA (specificato in Verbale Cabina di Regia del 23/7/2021), si considera il trend dell'indicatore 2.1 con % di positività arrotondata al suo valore intero più prossimo.

Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13

Aggiornamento del 22/12/2022

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 2-8 dicembre 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 9-15 dicembre 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 16-22 dicembre 2022	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 22/12/2022	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 22/12/2022
Abruzzo	547,2	476,3	369,6	16,6%	3,9%
Basilicata	189,3	174,3	167,0	12,3%	0,0%
Calabria	255,8	247,5	211,5	17,3%	9,5%
Campania	291,1	267,8	203,4	9,5%	2,3%
Emilia Romagna	486,8	361,5	267,3	18,8%	5,2%
Friuli Venezia Giulia	483,5	343,8	291,3	20,4%	5,1%
Lazio*	367,8	281,8	223,8	11,1%	2,6%
Liguria	505,2	386,7	292,2	28,7%	5,3%
Lombardia	353,6	261,7	203,8	12,2%	1,9%
Marche	526,9	428,4	313,5	19,8%	1,7%
Molise	278,2	256,6	267,2	6,8%	2,6%
PA di Bolzano	156,0	119,3	98,4	7,0%	0,0%
PA di Trento	262,5	176,5	143,9	7,9%	0,0%
Piemonte	379,2	260,8	175,3	9,3%	2,7%
Puglia	293,2	251,3	210,3	10,5%	1,1%
Sardegna	210,2	239,7	196,9	7,6%	3,4%
Sicilia	247,3	237,8	197,1	15,3%	4,0%
Toscana	376,0	274,8	209,2	10,3%	3,9%
Umbria	388,6	323,1	274,1	39,0%	5,5%
Valle d'Aosta	271,6	197,8	145,1	28,4%	0,0%
Veneto	615,9	452,4	383,4	15,0%	3,7%
ITALIA	375	296	233	13,7%	3,1%

Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 in merito agli indicatori individuati per la valutazione della necessità di applicazione di misure di contenimento e controllo dell'epidemia da SARS-CoV-2, si comunica che nel corso della riunione del 24 settembre 2021, la Cabina di Regia per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui all'allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al D.M. Salute 30 aprile 2020, in considerazione della verificata stabilità dei flussi relativi all'occupazione dei posti letto di Area Medica e di Terapia Intensiva e dell'opportunità di riferirsi al dato quanto più possibile aggiornato, ha ritenuto opportuno prendere a riferimento per la valutazione settimanale i dati riferiti alla giornata del giovedì antecedente la riunione di monitoraggio, che si svolge ogni venerdì. Qualora non disponibili, si utilizzeranno i dati più recenti.

**Si segnala che non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri della Regione Lazio (ultimo aggiornamento 21/12/2022).*