



## **Aggiornamento 11 gennaio 2023 - Periodo di riferimento: 02/01/2023-08/01/2023**

### ***Headline della settimana:***

*L'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in diminuzione rispetto alla precedente settimana di monitoraggio. Rimane contenuto l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione nelle aree mediche e sostanzialmente stabili nelle terapie intensive.*

*Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.*

*L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia. Si sottolinea l'importanza dei richiami vaccinali negli anziani e nei gruppi di popolazione più fragili, anche considerando la progressiva riduzione dell'effetto protettivo contro l'infezione per SARS-CoV-2 con il passare del tempo, sia per l'infezione pregressa che per la vaccinazione.*



## Punti chiave:

- Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 02 gennaio–08 gennaio 2023 ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 e del periodo 06 gennaio–12 gennaio 2023 sulla base dei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute. Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati hanno contratto l'infezione nella terza decade di dicembre 2022.
- **Incidenza in diminuzione:** I dati del flusso ISS nel periodo 2/1/2023 -8/1/2023 evidenziano una incidenza in diminuzione e pari a 173 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 220 per 100.000 abitanti nel periodo 26/12/2022-1/1/2023. Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute l'incidenza è in diminuzione (143 nel periodo 6/1/2023-12/1/2023 vs 231 nel periodo 30/12/2022-05/01/2023).
- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d'età 90+ anni con un'incidenza pari a 271 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Si registra una generale diminuzione dell'incidenza per 100.000 abitanti in tutte le fasce d'età. L'età mediana alla diagnosi è di 56 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti (dati flusso ISS).
- Nel periodo 21 dicembre 2022–03 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a **0,91 (range 0,77-1,11), in aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica**. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica:  $R_t=0,80$  (0,78-0,84) al 03/01/2023 vs  $R_t=0,90$  (0,86-0,94) al 27/12/2022. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/primo-piano/-/asset\\_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037](https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037)).
- **Sostanzialmente stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva a livello nazionale:** il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolato ai sensi del DM 30 aprile 2020 si situa al 3,3% (303/9.184) il giorno 10/01/2023, rispetto al 3,5% (319/9.176) il giorno 03/01/2023. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione passando da 319 (03/01/2023) a 303 (10/01/2023), con una diminuzione relativa del 5,0%. È stabile anche il tasso di occupazione calcolato dal Ministero della Salute ai sensi del DL 105/2021 relativo ad una data di poco successiva (12 gennaio 2023) che era pari a 3,1% vs 3,2% al 05 gennaio 2023.
- **In diminuzione il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale:** era al 10,9% (6.974/63.785) il giorno 10/01/2023, rispetto al 12,6% (8.039/63.769) il giorno 03/01/2023. Il numero di persone ricoverate in queste aree è diminuito da 8.039 (03/01/2023) a 6.974 (10/01/2023) con una diminuzione relativa del 13,2%. In diminuzione anche il tasso di occupazione calcolato dal Ministero della Salute ai fini degli indicatori decisionali ai sensi del DL 105/2021 relativi ad una data di poco successiva (12 gennaio 2023) che era pari al 10,1% vs 12,1% al 5 gennaio 2023.
- **Nessuna Regione/PA è classificata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020. Sette sono a rischio moderato e quattordici classificate a rischio basso. Nove** Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. **Due** Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.
- L'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in diminuzione rispetto alla precedente settimana di monitoraggio. Rimane contenuto l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione nelle aree mediche e sostanzialmente stabili nelle terapie intensive.
- Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
- L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia. Si sottolinea l'importanza dei richiami vaccinali negli anziani e nei gruppi di popolazione più fragili, anche considerando la progressiva riduzione dell'effetto protettivo contro l'infezione per SARS-CoV-2 con il passare del tempo, sia per l'infezione pregressa che per la vaccinazione.



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

---

# Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 139  
Sintesi nazionale

---

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)  
Dati relativi alla settimana 02/01/2023-08/01/2023  
(aggiornati al 11/01/2023)

---



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 11 gennaio 2023 relativi alla settimana 02/01/2023-08/01/2023

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 28/12/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	3459	-23.3	-227	0.83 (CI: 0.77-0.89)	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia	1	Bassa	No
Basilicata	1184	-6.0	1	1.38 (CI: 0.94-1.94)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte di resilienza	1	<b>Moderata</b>	No
Calabria	4200	-7.8	-10	1.19 (CI: 1.09-1.29)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Bassa	No
Campania	10246	-17.3	-8	0.92 (CI: 0.88-0.96)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Emilia-Romagna	6394	-33.3	-32	0.83 (CI: 0.79-0.87)	No	Bassa	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia	1	<b># Moderata</b>	No
FVG	2253	-27.3	-165	0.85 (CI: 0.81-0.88)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Lazio	11766	-23.8	-251	1.04 (CI: 1-1.09)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	2	Bassa	No
Liguria	1885	-38.7	-602	0.8 (CI: 0.77-0.84)	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia	1	Bassa	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 28/12/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Lombardia	11733	-28.5	-260	0.84 (CI: 0.82-0.86)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Marche	2743	-34.9	-21	0.93 (CI: 0.86-1)	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia	1	Bassa	No
Molise	676	-6.4	-1	1.37 (CI: 0.85-2.02)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Piemonte	3831	-28.8	-226	1.01 (CI: 0.81-1.24)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
PA Bolzano/Bozen	489	-10.3	-3	0.88 (CI: 0.78-1)	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia	1	Bassa	No
PA Trento	724	-21.8	12	1.11 (CI: 1.04-1.2)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte di resilienza	2	<b>Moderata</b>	No
Puglia	9100	-6.7	0	0.96 (CI: 0.92-1)	No	Bassa	Bassa	<b>2 allerte di resilienza.</b> Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia	1	<b># Moderata</b>	No
Sardegna	2612	-16.1	41	0.98 (CI: 0.91-1.06)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte di resilienza	1	<b>Moderata</b>	No
Sicilia	10467	-1.8	1108	1.14 (CI: 1.09-1.17)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte di resilienza	2	<b>Moderata</b>	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 28/12/2022)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissioni*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Toscana	4793	-28.3	-5	1.24 (CI: 1.2-1.28)	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento	2	Bassa	No
Umbria	2203	-31.4	1	1.08 (CI: 0.96-1.2)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia	1	<b>Moderata</b>	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	81	-36.7	-1	0.7 (CI: 0.53-0.9)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Veneto	11220	-32.9	-1934	0.95 (CI: 0.93-0.98)	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia	1	Bassa	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

\*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

# presenza di molteplici allerte di resilienza;



Ministero della Salute



## Dimensione 1 - completezza dei dati

### Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
<b>Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)</b>	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 11 gennaio 2023 relativi alla settimana 02/01/2023-08/01/2023

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
<b>Abruzzo</b>	98.6	98.7	Sopra soglia	100.0	100	98.7
<b>Basilicata</b>	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	NaN	100.0
<b>Calabria</b>	99.3	99.1	Sopra soglia	99.7	100	100.0
<b>Campania</b>	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	99.8
<b>Emilia-Romagna</b>	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	98.2
<b>FVG</b>	98.8	98.5	Sopra soglia	99.8	100	99.7
<b>Lazio</b>	97.1	97.3	Sopra soglia	99.9	100	94.4
<b>Liguria</b>	77.7	77.0	Sopra soglia	100.0	100	97.2
<b>Lombardia</b>	87.3	85.8	Sopra soglia	100.0	100	97.7
<b>Marche</b>	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Molise</b>	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Piemonte</b>	83.0	84.9	Sopra soglia	99.7	100	97.4
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	97.4	96.2	Sopra soglia	99.4	100	97.3
<b>PA Trento</b>	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	95.0
<b>Puglia</b>	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Sardegna</b>	99.1	98.6	Sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Sicilia</b>	97.9	97.3	Sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Toscana</b>	85.1	87.7	Sopra soglia	100.0	100	99.9
<b>Umbria</b>	72.6	73.1	Sopra soglia	100.0	100	99.8
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	100.0	99.6	Sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Veneto</b>	89.6	96.5	Sopra soglia	99.9	100	100.0





Ministero della Salute



## Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

### Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Stabilità di trasmissione	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e $\leq 1$ in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID- 19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione  Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact- tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



## Nota Metodologica

**NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto**

**Stima di Rt:** La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

**Valutazione del Rischio:** nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

**Dati sui focolai:** appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

**Casi importati:** La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

**Scenario settimanale di riferimento:** viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1$  e  $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1,25$  e  $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

**Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto:** Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione (in area medica e in terapia intensiva) sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

**Occupazione posti letto:** si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 11 gennaio 2023 relativi alla settimana 02/01/2023-08/01/2023

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	8344	-20.1	-23.3	0.83 (CI: 0.77-0.89)	201	2813	2%	15%
Basilicata	1980	-5.3	-6.0	<b>1.38 (CI: 0.94-1.94)</b>	9	69	0%	15%
Calabria	9053	-5.2	-7.8	<b>1.19 (CI: 1.09-1.29)</b>	20	432	8%	20%
Campania	22546	-19.2	-17.3	0.92 (CI: 0.88-0.96)	838	3644	3%	10%
Emilia-Romagna	16529	-29.8	-33.3	0.83 (CI: 0.79-0.87)	3	5959	5%	13%
FVG	5534	-25.4	-27.3	0.85 (CI: 0.81-0.88)	283	1684	1%	17%
Lazio	26550	-23.4	-23.8	<b>1.04 (CI: 1-1.09)</b>	170	469	3%	11%
Liguria	5195	-39.0	-38.7	0.8 (CI: 0.77-0.84)	235	1362	4%	18%
Lombardia	28212	-29.5	-28.5	0.84 (CI: 0.82-0.86)	99	9334	2%	8%
Marche	7395	-36.6	-34.9	0.93 (CI: 0.86-1)	110	512	2%	15%
Molise	1415	-12.3	-6.4	<b>1.37 (CI: 0.85-2.02)</b>	16	0	3%	9%
Piemonte	10253	-30.8	-28.8	<b>1.01 (CI: 0.81-1.24)</b>	307	1792	1%	6%
PA Bolzano/Bozen	1050	-11.5	-10.3	0.88 (CI: 0.78-1)	31	394	3%	6%
PA Trento	1660	-20.3	-21.8	<b>1.11 (CI: 1.04-1.2)</b>	98	427	3%	8%
Puglia	18788	-4.6	-6.7	0.96 (CI: 0.92-1)	16	8430	3%	9%
Sardegna	5995	<b>3.6</b>	-16.1	0.98 (CI: 0.91-1.06)	152	1177	4%	6%
Sicilia	21703	<b>1.5</b>	-1.8	<b>1.14 (CI: 1.09-1.17)</b>	708	8169	6%	17%
Toscana	11837	-27.0	-28.3	<b>1.24 (CI: 1.2-1.28)</b>	129	4715	4%	8%
Umbria	5465	-29.1	-31.4	<b>1.08 (CI: 0.96-1.2)</b>	1	1472	10%	31%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	214	-28.8	-36.7	0.7 (CI: 0.53-0.9)	2	87	0%	1%
Veneto	28373	-31.3	-32.9	0.95 (CI: 0.93-0.98)	274	3571	3%	12%

\*dato aggiornato al giorno 10/01/2023 (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore).

## Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

### Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese*  *Il calcolo di questo indicatore, senza modificare la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione in setting ospedalieri/PS  Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS  VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale $\leq 5$ gg	Mediana settimanale $> 5$ gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale $\leq 3$ gg	Mediana settimanale $> 3$ gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
Possibilità di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Abruzzo</b>	28%	25%	1	Non calcolabile	0.6 per 10000	0.7 per 10000	1.3 per 10000	<b>69.8%</b>	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia
<b>Basilicata</b>	26%	23%	2	0	1.6 per 10000	4.1 per 10000	5.6 per 10000	92.4%	0 allerte di resilienza
<b>Calabria</b>	23%	20%	0	0	0.6 per 10000	1.1 per 10000	1.7 per 10000	91.3%	0 allerte di resilienza
<b>Campania</b>	20%	17%	1	1	0.4 per 10000	0.6 per 10000	1 per 10000	90.7%	0 allerte di resilienza
<b>Emilia-Romagna</b>	25%	20%	2	Non calcolabile	0.4 per 10000	0.5 per 10000	<b>0.9 per 10000</b>	<b>21%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia e ind 2.6 sottosoglia
<b>FVG</b>	40%	32%	1	1	0.8 per 10000	0.9 per 10000	1.6 per 10000	97.7%	0 allerte di resilienza
<b>Lazio</b>	22%	16%	1	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	90.6%	0 allerte di resilienza
<b>Liguria</b>	11%	8%	0	0	0.2 per 10000	0.5 per 10000	<b>0.7 per 10000</b>	77%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia
<b>Lombardia</b>	2%	2%	1	Non calcolabile	0.6 per 10000	0.6 per 10000	1.2 per 10000	97.8%	0 allerte di resilienza
<b>Marche</b>	29%	21%	0	0	0.1 per 10000	0.1 per 10000	<b>0.1 per 10000</b>	100%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Molise</b>	29%	24%	0	0	1.1 per 10000	2.7 per 10000	3.8 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
<b>Piemonte</b>	21%	18%	1	Non calcolabile	0.5 per 10000	0.6 per 10000	1.1 per 10000	84.6%	0 allerte di resilienza
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	8%	6%	0	0	0.2 per 10000	0.3 per 10000	<b>0.6 per 10000</b>	97%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia
<b>PA Trento</b>	27%	24%	2	2	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
<b>Puglia</b>	44%	41%	0	0	0.3 per 10000	0.5 per 10000	<b>0.7 per 10000</b>	<b>47.3%</b>	<b>2 allerte di resilienza.</b> Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia
<b>Sardegna</b>	36%	32%	1	Non calcolabile	0 per 10000	1 per 10000	1.1 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
<b>Sicilia</b>	19%	18%	0	Non calcolabile	1 per 10000	1.7 per 10000	2.7 per 10000	91.9%	0 allerte di resilienza
<b>Toscana</b>	55%	<b>73%</b>	0	3	0.1 per 10000	0.9 per 10000	1 per 10000	78.3%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Umbria</b>	30%	22%	1	1	0.1 per 10000	0.7 per 10000	<b>0.9 per 10000</b>	92.3%	<b>1 allerta di resilienza.</b> Totale risorse umane sottosoglia
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	15%	12%	2	2	0.4 per 10000	0.6 per 10000	1 per 10000	96.6%	0 allerte di resilienza
<b>Veneto</b>	16%	12%	1	1	1 per 10000	1.8 per 10000	2.9 per 10000	<b>56.2%</b>	<b>1 allerta di resilienza.</b> Ind 2.6 sottosoglia

\*le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

\*\* in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

#Come concordato con le Regioni/PPAA (specificato in Verbale Cabina di Regia del 23/7/2021), si considera il trend dell'indicatore 2.1 con % di positività arrotondata al suo valore intero più prossimo.

*Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13*

**Aggiornamento del 12/01/2023**

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 23-29 dicembre 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 30 dicembre 2022 - 5 gennaio 2023	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 6-12 gennaio 2023	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 12/01/2023	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 12/01/2023
Abruzzo	343,7	374,4	232,7	13,5%	3,3%
Basilicata	155,2	210,2	145,6	14,2%	1,6%
Calabria	213,8	273,3	213,1	20,1%	5,3%
Campania	189,3	232,0	143,6	9,2%	2,8%
Emilia Romagna	218,5	212,2	120,6	12,2%	4,5%
Friuli Venezia Giulia	249,7	260,8	154,3	13,8%	1,7%
Lazio	227,9	270,3	167,7	10,9%	2,5%
Liguria	228,1	189,4	94,1	16,2%	3,1%
Lombardia	162,9	160,9	92,8	6,7%	1,5%
Marche	281	275,6	149,2	13,8%	2,2%
Molise	208,1	258,6	201,5	9,7%	5,1%
PA di Bolzano	91,1	112,7	100,4	5,0%	1,0%
PA di Trento	153,8	178,7	106,8	7,2%	2,2%
Piemonte	138,4	137,9	71,7	5,9%	1,9%
Puglia	197,2	284,7	191,4	8,8%	2,8%
Sardegna	176,7	208,1	120,0	5,9%	4,9%
Sicilia	181,2	259,6	209,4	16,3%	6,0%
Toscana	187,3	176,8	108,9	7,0%	3,5%
Umbria	312	370,8	207,9	30,8%	7,9%
Valle d'Aosta	185,7	102,2	60,8	0,0%	0,0%
Veneto	329,1	333,7	177,7	10,9%	3,6%
<b>ITALIA</b>	<b>207</b>	<b>231</b>	<b>143</b>	<b>10,1%</b>	<b>3,1%</b>

**Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile**

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 in merito agli indicatori individuati per la valutazione della necessità di applicazione di misure di contenimento e controllo dell'epidemia da SARS-CoV-2, si comunica che nel corso della riunione del 24 settembre 2021, la Cabina di Regia per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui all'allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al D.M. Salute 30 aprile 2020, in considerazione della verificata stabilità dei flussi relativi all'occupazione dei posti letto di Area Medica e di Terapia Intensiva e dell'opportunità di riferirsi al dato quanto più possibile aggiornato, ha ritenuto opportuno prendere a riferimento per la valutazione settimanale i dati riferiti alla giornata del giovedì antecedente la riunione di monitoraggio, che si svolge ogni venerdì. Qualora non disponibili, si utilizzeranno i dati più recenti.