





P.Re.Val.E.
P.Re.Val.E.

Programma Regionale Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari


Trattamento chirurgico della frattura del collo del femore. E' PIU' FREQUENTE L'INTERVENTO ENTRO 2 GIORNI.




Infarto STEMI (con ostruzione coronarica totale). E' PIU' FREQUENTE IL TRATTAMENTO TEMPESTIVO CON ANGIOPLASTICA.




Infarto miocardico acuto. SCENDE LA MORTALITA' A TRENTA GIORNI.



Nascita. DIMINUISCONO I TAGLI CESAREI PRIMARI.





Colecistectomie laparoscopiche. AUMENTANO I CASI DI DEGENZA **INFERIORE AI 3 GIORNI**.





Cancro della mammella.

**AUMENTANO GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE
IN CORSO DI RICOVERO DOPO CHIRURGIA DEMOLITIVA.**



Cancro della mammella.

DIMINUISCONO I NUOVI INTERVENTI ENTRO 120 GIORNI DA UNA PRIMA CHIRURGIA.




**LA QUALITA' E L'APPROPRIATEZZA
DELL'ASSISTENZA SANITARIA
NELLA REGIONE LAZIO
CONTINUANO A MIGLIORARE.**




Frattura del collo del femore trattata entro 2 giorni. SI RIDUCONO LE DISUGUAGLIANZE DI ACCESSO.

LAUREA | NESSUN TITOLO DI STUDIO O LICENZA ELEMENTARE



Infarto STEMI (con ostruzione coronarica totale). SI RIDUCONO LE **DISUGUAGLIANZE** DI ACCESSO.

LAUREA | NESSUN TITOLO DI STUDIO O LICENZA ELEMENTARE



Parto cesareo primario. SI RIDUCONO LE DISUGUAGLIANZE DI ACCESSO.

LAUREA | NESSUN TITOLO DI STUDIO O LICENZA ELEMENTARE



**A MAGGIORE QUALITA' E APPROPRIATEZZA
SI ACCOMPAGNA
LA RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE
NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E
NELLE CURE.**

